Exercice 1

Notions abordées : probabilités

Il s'agit de savoir si 4 affirmations sont vraies ou fausses.

1. On cherche à calculer $P(\bar{R}|S)$.

$$P(\bar{R}|S) = \frac{P(\bar{R} \cap S)}{P(S)}$$

Astuce : Pour calculer la probabilité d'une issue comme ici $P(S)$, il suffit de sommer les probabilités des branches qui se terminent par S. C'est la formule des probabilités totales.

Ici, on a 2 branches qui se terminent par S. En appliquant la formule des probabilités totales on a donc

$$\begin{aligned} P(S) &= P(R \cap S) + P(\bar{R} \cap S) \\ &= 0.2 \times 0.3 + 0.7 \times 0.4 \\ &= 0.06 + 0.28 \\ &= 0.34 \end{aligned}$$

$$\text{Donc } P(\bar{R}|S) = \frac{P(0.06)}{P(0.34)} \approx 0.18.$$

Donc l'affirmation est **FAUSSE**.

2. On sait que l'espérance d'une variable aléatoire qui suit une loi uniforme sur $[a, b]$ est donnée par $E[X] = \frac{a+b}{2}$.

On doit donc résoudre $\frac{x+18}{2} = 12$.

$$\begin{aligned} \frac{x+18}{2} &= 12 \\ \iff x + 18 &= 24 \\ \iff x &= 6 \end{aligned}$$

Donc l'affirmation est **FAUSSE**.

3. On a l'équation $\ln(x^2) - \ln\left(\frac{x^5}{e}\right) + \ln(2) = \ln(2x) + 5$

Astuce : On simplifie l'équation en utilisant les propriétés du logarithme :

$$\begin{aligned} \ln(ab) &= \ln(a) + \ln(b) \\ \ln\left(\frac{a}{b}\right) &= \ln(a) - \ln(b) \\ \ln(a^n) &= n \ln(a) \\ \ln(e) &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \ln(x^2) - \ln\left(\frac{x^5}{e}\right) + \ln(2) = \ln(2x) + 5 \\ \iff & 2\ln(x) - 5\ln(x) + \ln(e) + \ln(2) = \ln(2) + \ln(x) + 5 \\ \iff & -4\ln(x) + \ln(e) = 5 \\ \iff & -4\ln(x) + 1 = 5 \\ \iff & \ln(x) = -1 \\ \iff & x = \frac{1}{e} \end{aligned}$$

Donc l'affirmation est **VRAIE**.

4. Il y a une tangente parallèle à l'axe des abscisses lorsque la dérivée, c'est à dire f' s'annule. La fonction f' est continue et décroissante sur l'intervalle $[0, 5]$ à valeurs dans l'intervalle $[30, -5]$. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe au moins une valeur de x pour laquelle f' s'annule sur l'intervalle $[0, 5]$. On applique le même raisonnement sur l'intervalle $[5, 15]$.

On en déduit qu'il y a au moins 2 tangentes horizontales.

Donc l'affirmation est **FAUSSE**.

5. C'est uniquement l'application d'une propriété du cours, une fonction est convexe sur I si et seulement si sa dérivée est croissante sur ce même intervalle.

Ici la fonction f' est croissante sur $[5, 15]$.

Donc la fonction f est convexe sur $[5, 15]$.

Donc l'affirmation est **VRAIE**.

Exercice 2

Notions abordées : probabilités, algorithmique. Comme beaucoup d'exercices de probabilité, cet exercice est très simple si on prend le temps de bien lire l'énoncé et qu'on sait utiliser sa calculette.

1a) La suite (u_n) représente l'évolution du nombre de pommiers de Laurence.

Prenons l'année n , on a alors u_n pommiers.

On sait que lorsqu'on passe à l'année $n + 1$, Laurence plante 22 nouveaux pommiers par hectare.

De plus, elle élimine 4 pourcents de pommiers existants, ce qui revient à en conserver 96 pourcents, ce qui correspond à avoir $0.96u_n$ pommiers.

On a donc $u_{n+1} = 0.96u_n + 22$.

1b) On applique la formule de la question précédente.

On a $u_0 = 300$ pommiers pour 2018.

En 2019, $u_1 = 0.96 \times 300 + 22 = 310$ pommiers.

En 2020, $u_2 = 0.96 \times 310 + 22 = 319.6$ arrondi à 320 pommiers.

2.a) Il suffit de compléter l'algorithme avec la condition d'arrêt qui correspond à U devient plus grand que 400 et la mise à jour de U avec la formule de la question 1a. On ajoute donc les lignes :

- tant que $U < 400$
- $U \leftarrow 0.96U + 22$

2b) En rentrant ce programme dans la calculette on trouve que $N = 13$.

Il faut donc attendre 2031.

3a. on définit la suite (v_n) par $v_n = u_n - 550$

$$v_n = u_n - 550$$

$$\begin{aligned} \text{Donc, } v_{n+1} &= u_{n+1} - 550 \\ &= 0.96u_n + 22 - 550 \\ &= 0.96u_n - 528 \\ &= 0.96(u_n - 550) \\ &= 0.96v_n \end{aligned}$$

Donc (v_n) est une suite géométrique de raison 0.96 et de premier terme $v_0 = u_0 - 550 = 300 - 550 = -250$.

3b. On applique la formule du cours qui donne l'expression d'un terme d'une suite géométrique.

$$\forall n \in \mathbb{N}, v_n = v_0 q^n = -250 \times 0.96^n.$$

Il suffit ensuite de combiner les résultats précédentes.

$$\text{On a } v_n = u_n - 550$$

$$\text{et } v_n = -250 \times 0.96^n$$

$$\begin{aligned} u_n - 550 &= -250 \times 0.96^n \\ \iff u_n &= 550 - 250 \times 0.96^n \end{aligned}$$

3c. Le nombre de pommiers en 2025 correspond à $u_{2025-2018} = u_7$.

On applique la formule de la question précédente.

$$u_7 = 550 - 250 \times 0.96^7 \approx 362$$

3.d On résout $u_n > 400$.

$$u_n > 400$$

$$\iff 550 - 250 \times 0.96^n > 400$$

$$\iff -250 \times 0.96^n > -150$$

$$\iff 0.96^n < \frac{-150}{-250}$$

$$\iff 0.96^n < \frac{3}{5}$$

$$\iff n \ln(0.96) < \ln(0.6)$$

$$\iff n > \frac{\ln(0.6)}{\ln(0.96)}$$

$$\iff n > 12$$

On retrouve bien le $N = 13$ de la question 2b.

Exercice 3

Notions abordées : probabilités, algorithmique. Comme beaucoup d'exercices de probabilité, cet exercice est très simple si on prend le temps de bien lire l'énoncé et qu'on sait utiliser sa calculatrice.

Partie A

1. Il suffit d'utiliser sa calculatrice pour calculer $P(X \leq 8) \approx 0.11$

2. Il suffit d'utiliser sa calculatrice pour calculer $P(8 \leq X \leq 26) \approx 0.85$

3. On veut justifier sans utiliser la calculatrice que $P(3.5 \leq X \leq 27.5) \approx 0.95$.

On remarque que $15.5 - 2\sigma = 3.5$ et $15.5 + 2\sigma = 27.5$.

Or on sait que $P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) \approx 0.95$

Partie B

1. Soit X la variable aléatoire qui compte le nombre de tirage parmi les 10 tirages. X suit donc une loi binomiale de paramètre $n = 10$ et $p = 0.25$.

En effet, pour chaque tirage est identique et indépendant. De plus, il n'y a à chaque fois que 2 issues possibles :

- succès, l'échantillon a été prélevé par l'équipe de Sébastien
- échec, l'échantillon n'a pas été prélevé par l'équipe de Sébastien

2. Si $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ alors pour tout entier k compris entre 0 et n on a :

$$p(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

On applique pour $k = 4$, $n = 10$, et $p = 0.25$.

$$p(X = 4) = \binom{10}{4} 0.4^4 \times 0.6^6 \approx 0.15$$

3. La probabilité qu'au moins 2 relevés soient effectués par l'équipe de Sébastien correspond à $P(X \geq 2)$.

Astuce : On ne peut pas faire à la calculatrice $P(X \geq k)$, il faut donc utiliser le fait que $P(X \geq k) = 1 - P(X \leq k - 1)$

Il n'y a pas de formules simples, il faut le faire à la calculatrice.

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X \leq 1) \approx 0.76.$$

Partie C

On veut obtenir un intervalle au niveau de confiance de 95 pourcents dont l'amplitude est inférieure à 0,1.

Pour rappel l'amplitude d'un intervalle de fluctuation est de $\frac{2}{\sqrt{n}}$.

On veut donc résoudre $\frac{2}{\sqrt{n}} < 0.1$

$$\begin{aligned} & \frac{2}{\sqrt{n}} < 0.1 \\ \Leftrightarrow & 2 < 0.1\sqrt{n} \\ \Leftrightarrow & 10 < \frac{\sqrt{n}}{2} \\ \Leftrightarrow & 20 < \sqrt{n} \\ \Leftrightarrow & 400 < n \end{aligned}$$

Il faut donc au moins 401 échantillons.

Exercice 4

Notions abordées : étude d'une fonction, convexité, lecture graphique.

Partie A

Dans toute cette partie, les réponses sont obtenues graphiquement à partir de la courbe représentative de f donnée en annexe 2.

On admet que le point A de C_f d'abscisse 7 est un point d'inflexion de C_f .

1) On peut lire graphiquement que $f(0) = 113$ et $f(60) = 70$.

2) On cherche $f''(7)$. Puisque 7 est un point d'inflexion on en déduit que $f''(7) = 0$.

3) On considère la surface située entre l'axe des abscisses, la courbe C_f et les droites d'équation $x = 0$ et $x = 60$.

a) On a la figure suivante :

3b) On remarque que l'aire hachurée comprend au moins 20 complets (et certains incomplets). Un carreau a une aire de $10 \times 20 = 200ua$.

L'aire hachurée est donc au moins de $200 \times 20 = 4000ua$.

On peut donc en déduire que l'estimation est fausse.

Partie B

1) On sait que la fonction f est dérivable sur l'intervalle $[0, 60]$. Il suffit donc de dériver la fonction, $\forall x \in [0, 60]$, on a

$$\begin{aligned} f'(x) &= 14e^{-x/5} + (14x + 42) \times \left(-\frac{1}{5}e^{-x/5}\right) \\ &= \left(14 - \frac{1}{5} \times (14x + 42)\right) e^{-x/5} \\ &= \frac{1}{5}(70 - 14x - 42)e^{-x/5} \\ &= \frac{1}{5}(-14x + 28)e^{-x/5} \end{aligned}$$

2.a) D'après la question précédente étudier le signe de $f'(x)$ revient à étudier le signe de $\frac{1}{5}(-14x + 28)e^{-x/5}$.

Astuce : Une exponentielle est toujours positive. Cela signifie que $\forall x \in \mathbb{R}, e^x > 0$, mais aussi que quelque soit la fonction $u, \forall x \in \mathbb{R}, e^u(x) > 0$

On sait que $\forall x \in \mathbb{R}, e^x > 0$.

Donc $\forall x \in \mathbb{R}, e^{-x/5} > 0$.

Il suffit donc d'étudier le signe de $-14x + 28$.

$$\begin{aligned} & -14x + 28 > 0 \\ \Leftrightarrow & -14x > -28 \\ \Leftrightarrow & 14x < 28 \\ \Leftrightarrow & x < 2 \end{aligned}$$

On en déduit donc que :

- $f'(x) = 0$ si $x = 2$
- $f'(x) < 0$ si $x < 2$
- $f'(x) > 0$ si $x > 2$

2.b) Avec les résultats de la question précédente on obtient le tableau de variation suivant :

3) Une fonction est convexe si et seulement sa dérivée seconde est positive.

On peut lire sur la capture d'écran que $\forall x \in [0, 60], f''(x) = 14e^{\frac{x}{5}} \times \frac{x-7}{25}$.

Il faut donc étudier le signe de $f''(x)$.

On précédemment on a que $14e^{\frac{x}{5}} > 0$.

Le signe dépend uniquement de $x - 7$.

Donc pour $x < 7$ c'est à dire sur $[0, 7], f''(x) < 0$ et f est concave.

Donc pour $x > 7$ c'est à dire sur $[7, 60], f''(x) > 0$ et f est convexe.

Astuce : Pour montrer qu'une fonction G est une primitive d'une autre fonction g , il suffit de dériver G et de montrer qu'on obtient g

4.a)

$$\begin{aligned} \forall x \in [0, 60] &= -70e^{\frac{-x}{5}} - \frac{1}{5}(-70x - 560)e^{\frac{-x}{5}} \\ &= -70e^{\frac{-x}{5}} + 14xe^{\frac{-x}{5}} + 112e^{\frac{-x}{5}} \\ &= e^{\frac{-x}{5}}(14x + 42) \\ &= g(x) \end{aligned}$$

Donc G est une primitive de g sur l'intervalle de $[0, 60]$.

4.b) On remarque que $f(x) = 70 + g(x)$.

On en déduit donc qu'une primitive de f sur $[0, 60]$ est $F(x) = 70x + (-70x - 560)e^{\frac{-x}{5}}$.

4.c) On a en utilisant le résultat précédente :

$$\begin{aligned} A &= \int_0^{60} f(x) dx \\ &= F(60) - F(0) \\ &= 4200 - 4760e^{-12} + 560 \\ &= 4760(1 - e^{-12}) \\ &\approx 4760 \text{ u.a} \end{aligned}$$

Astuce : Il faut se rappeler que si F est une primitive de f alors $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$. Attention à bien exprimer le résultat en u.a qui signifie unités d'aire.

Partie C

D'après la partie précédente, l'aire d'un accoudoir est de 4700 ua.

L'aire totale à vernir est donc $4760 \times 2 + 5400 = 14920 \text{ cm}^2 = 1,492\text{m}^2$.

Or il lui reste un quart d'un pot de vernis qui peut couvrir 10m^2 .

Il peut donc couvrir $\frac{1}{4}10 = 2,5\text{m}^2$.

Il a donc assez de vernis.